STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BOUNDING ATTACHMENT, IMD PADA BAYI BARU LAHIR

NO	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab Tgl ……			Ujian Tgl ……			Klinik Tgl ……		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
I	**PERSIAPAN** 1. Bak instrumen berisi : - Nalfuder - Jarum - Benang jahit - Spuit 10cc - Lidocain - Gunting episiotomi - Sarung tangan steril/DTT - Lampu sorot 2. Episiotomy dilakukan pada saat adanya regangan perenium dan diameter kepala terlihat divulva 3-4 cm									
II	**LANGKAH KERJA** 1. Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu dikamar bersalin. 2. Dalam menolong ibu melahirkan disarankan untuk mengurangi / tidak menggunakan obat kimiawi. 3. Bayi lahir, segera dikeringkan secepatnya terutama kepala, kecuali tangannya; tanpa menghilangkan vernix mulut dan hidung bayi dibersihkan, tali pusat. 4. cBila bayi tidak membutuhkan resusitasi, bayi ditengkurapkan di dada - perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu dan mata bayi setinggi puting susu. Keduanya diselimuti. Bayi dapat diberi topi. 5. Anjurkan ibu menyentuh bayi untuk merangsang bayi. Biarkan bayi mencari puting sendiri. 6. Ibu di dukung dan dibantu mengenali perilaku bayi sebelum menyusu. 7. Biarkan kulit bayi bersentuhan dengan kulit ibu selama paling tidak satu jam; bila menyusu awal terjadi sebelum 1 jam, tetap biarkan kulit ibu dan bayi bersentuhan sampai setidaknya 1 jam. 8. Bila dalam 1 jam menyusu awal belum terjadi, bantu ibu dengan mendekatkan bayi ke puting tapi jangan memasukkan puting ke mulut bayi. Beri waktu kulit melekat pada kulit 30 menit atau 1 jam lagi									
III	**SIKAP** - Sabar - Sopan - Teliti									
IV	**PENYELESAIAN** - Pencatatan dan pelaporan									