

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KOLABORASI INTERPROFESIONAL DALAM PENATALAKSANAAN EFEK SAMPING  
KONTRASEPSI PIL**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| No  | KOMPONEN KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENCAPAIAN |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LAB        |          |          | UJIAN    |          |          | KLINIK   |          |          |
|     | Tgl.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tgl.....   | Tgl..... | Tgl..... | Tgl..... | Tgl..... | Tgl..... | Tgl..... | Tgl..... | Tgl..... |
|     | NILAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 1        | 2        | 0        | 1        | 2        | 0        | 1        | 2        |
|     | <p>pemakaian pil dang anti dengan kontrasepsi non hormonal</p> <p>5) Untuk mual bila mengganggu berikan metoklopramid 3x10 mg dan diberikan 15 menit sebelum makan selama 5 – 7 hari.</p> <p>6) Anjurkan makan secara teratur.</p> <p>7) Bila muntah dalam waktu 2 jam setelah minum pil aktif, maka ambil pil aktif dari strip yang lain</p> |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| III | <p>SIKAP</p> <p>1. Ramah dan sopan</p> <p>2. Berempati</p> <p>3. Menggunakan Bahasa yang jelas dan mudah dimengerti</p>                                                                                                                                                                                                                       |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| IV  | <p>PENYELESAIAN</p> <p>Melakukan dokumentasi hasil konseling dalam kartu KB dan buku register</p>                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |