STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOLABORASI INTERPROFESIONAL PENANGANAN AWAL KOMPLIKASI KONTRASEPSI AKBK

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		LAB Tgl……			UJIAN Tgl……			KLINIK Tgl……		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
I	1. Ucapkan salam dan sapa klien dengan ramah 2. Menanyakan apakah ada yang bisa dibantu: a. Apakah puas menggunakan AKBK? b. Ada pertanyaan atau keluhan? 3. Lakukan pemeriksaan kesehatan ibu									
II	TATA LAKSANA 1. Ekspulsi implant a. Konseling 1) Jelaskan sebab terjadinya 2) Jaga kebersihan dan menghindari gerakan yang keras b. Pengobatan 1) Periksa apakah kapsul masih ada di tempatnya atau tidak. Periksa pula adanya tanda-tanda infeksi pada daerah insersi. 2) Bila tidak ada infeksi dan kapsul yang lain masih berada di tempatnya maka cabut 1 kapsul yang ekspulsi sedangkan sisanya dipertahankan. Jangan lupa mencabut implant setahun lebih awal dari semestinya. 3) Bila ada tanda-tanda infeksi: ▪ Anjurkan klien untuk memakai kontrasepsi lain ▪ Cabut kapsul yang ada dan pasang kapsul yang baru pada sisi lengan yang lain 2. Nyeri perut bagian bawah/ nyeri panggul a. Konseling: Jelaskan bahwa gejala ini bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya b. Pengobatan 1) Periksa TTV: nadi, suhu dan tensi 2) Rujuk jika perut bagian bawah tegang, nadi > 100x/menit, tekanan darah < 90/60 mmHg 3) Bila gejala tidak bisa diatasi cabut implant dan ganti dengan kontrasepsi non hormonal 3. Infeksi pada luka insisi a. Konseling: Jelaskan bahwa luka insisi dapat terinfeksi jika perawatan luka tidak higienis/ luka terbuka atau kena air b. Pengobatan 1) Bila infeksi tanpa abses ▪ Bersihkan luka dengan air dan sabun/ cairan anti septik kemudian berikan antibiotik oral (ampisilin/amoxilin 3x500 mg/hari selama 5–7 hari) ▪ Bila tidak membaik, cabut semua kapsul dan pasang kapsul baru pada sisi lengan lain atau anjurkan klien untuk mengganti kontrasepsi lain. 2) Bila terjadi abses									

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		LAB Tgl……			UJIAN Tgl……			KLINIK Tgl……		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
	▪ Bersihkan daerrah luka dengan cairan antiseptic ▪ Alirkan dan insisi PUS kemudian cabut semua kapsul ▪ Lakukan perawatan luka dan beri antibiotic oral seperti amoxilin atau ampisilin 3x500 mg/ hari selama 5 – 7 hari 3) Pasang kapsul baru pada sisi lengan yang lain atau anjurkan klien untuk ganti kontrasepsi lain									
III	SIKAP 1. Ramah dan sopan 2. Berempati 3. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti									
IV	PENYELESAIAN Melakukan dokumentasi hasil konseling dalam kartu KB dan buku register									