**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**
**KOLABORASI INTERPROFESIONAL PENANGANAN AWAL KOMPLIKASI KONTRASEPSI SUNTIK**

| No | KOMPONEN KERJA | PENCAPAIAN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAB Tgl…… | | | UJIAN Tgl…… | | | KLINIK Tgl…… | | |
| | NILAI | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| I | 1. Ucapkan salam dan sapa klien dengan ramah<br>2. Menanyakan apakah ada yang bisa dibantu:<br>a. Apakah puas menggunakan suntik?<br>b. Apakah datang untuk suntik ulang<br>c. Ada pertanyaan atau keluhan?<br>3. Lakukan pemeriksaan kesehatan ibu<br>4. Bila ibu mengeluh:<br>a. Nyeri dada hebat atau nafas terasa pendek; kemungkinan adanya bekuan darah di paru-paru atau serangan jantung<br>b. Sakit kepala hebat dan gangguan pengelihatan; kemungkinan terjadi strok/hipertensi/migrain<br>c. Nyeri tungkai hebat; kemungkinan terjadi sumbatan pembuluh darah pada tungkai<br>d. Tidak terjadi perdarahan atau *spotting* selama 7 hari sebelum suntikan berikutnya; maka kemungkinan terjadi kehamilan<br>5. Bila terdapat salah satu atau sebagaian gejala di atas dan hasil pemeriksaan kesehatan ibu mendukung tanda gejala yang ada; maka konseling ibu untuk diRUJUK guna memperoleh penanganan lebih lanjut<br>6. Lakukan konsultasi dengan dokter tempat pasien akan dirujuk, sampaikan informasi terkait pasien yang akan dirujuk<br>7. Siapkan surat rujukan lengkap | | | | | | | | | |
| II | SIKAP<br>1. Berempati<br>2. Teliti dan berhati-hati | | | | | | | | | |