STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MELAKUKAN EPISIOTOMI SESUAI INDIKASI

NO	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab Tgl ……			**Ujian** Tgl ……			**Klinik** Tgl ……		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
I	**PERSIAPAN ALAT**									
	1. Bak instrument berisi: - Gunting episiotomy - Kassa steril - Spuit steril 5 cc 2. Kapas air DTT 3. Obat-obatan: - Lidocain 2% - Aquades									
II	**LANGKAH KERJA**									
	1. Beritahu tindakan yang akan dilakukan 2. Melakukan anastesi local: - Membuka ampol lidocain 2% - Pakai sarung tangan - Hisap lidocain 2% ke dalam spuit 5 cc - Oplos dengan aquades dengan perbandinagn yang sama sehingga menjadi 1% - Letakkan kembali dalam bak instrument - Membersihkan perineum dengan air DTT - Suntikkan lidocain pada perineum dengan 1 tusukkan ke arah lateral, semi lateral, medial 3. Melakukan episiotomy, jari kedua dan ketiga dimasukkan antara kepala bayi dan dinding vagina menghadap perineum 4. Gunting dimasukkan terbuka dengan dilindungi jari-jari yang ada di dalam 5. Bertepatan dengan his dan diameter vulva 4-5 cm dilakukan episiotomy dengan sudut antara 10-80º samping kiri atau kanan perineum 6. Buka luka robekan ditekan dengan kasa steril 7. Lanjutkan pertolongan persalinan									
III	**SIKAP**									
	1. Sabar 2. Sopan 3. Teliti									
IV	**PENYELESAIAN**									
	1. Pertolongan persalinan 2. Penjahitan luka episiotomy 3. Pencatatan dan pelaporan									