STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MELAKUKAN PENATALAKSANAAN EFEK SAMPING KOTRASEPSI KONDOM

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		LAB Tgl……			UJIAN Tgl……			KLINIK Tgl……		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
I	1. Beri salam dan bersikap ramah 2. Tanyakan pakah ada yang bisa dibantu: a. Puaskah menggunakan kondom? b. Apakah ada pertanyaan lain terkait kondom atau ada masalah; jika ada keluhan, ajak klien berbagi kekhawatirannya dengan: • Mendengarkan cerita klien, minta klien menjelaskan keluhannya • Tanggapi semua komentar dengan serius, jangan remehkan kekhawatiran • Jawab pertanyaan dan rumor dengan hormat c. Bermasalah setiap kali memakai kondom atau pasangan tidak mau memakai kondom: • Jelaskan resiko pemakaian kondom yang tidak konsisten • Anjurkan menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lainnya • Diskusikan cara pemakaian kondom yang lebih nyaman • Praktikkan bersama klien cara membicarakan hal tersbut dengan pasangan									
II	TATA LAKSANA: 1. Kondom rusak/bocor a. Konseling 1) Jelaskan kemungkinan sebab terjadinya 2) Jelaskan cara memasang kondom yang benar 3) Periksa kondom yang terpasang pada penis sebelum penetrasi ke vagina 4) Jika ditemukan/ dicurigai kondom bocor/ robek, segera ganti dengan kondom yang baru b. Pengobatan Jika terjadi hubungan seksual dengan kondom yang bocor/robek/ rusak kurang dari 72 jam, pertimbangkan pemberian pil pasca senggama/*morning after pil*. Dosis yang diberikan, permulaan 2 tablet, 12 jam kemudian 2 tablet lagi dan terangkan efek mual dan muntah. 2. Iritasi Alergi a. Konseling 1) Jelaskan sebab terjadinya alergi 2) Bila terjadi reaksi ringan tidak perlu pengobatan b. Pengobatan 1) Pastikan gejala tersebut adalah reaksi alergi bukan infeksi 2) Reaksi alergi yang mengganggu berikan anti histamine dengan dosis CTM 3x1 tablet selama 3 – 5 hari 3) Anjurkan mengganti jenis kondom/memakai metode kontrasepsi lain									

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		LAB Tgl……			UJIAN Tgl……			KLINIK Tgl……		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
	3. Gatal a. Konseling 1) Jelaskan sebab terjadinya gatal 2) Bila terjadi reaksi ringan maka berikan pengobatan b. Pengobatan 1) Pemakaian pelicin bisa membantu mengurangi rasa gatal. Pelican yang digunakan harus **berbahan dasar air**, bukan minyak (glycerin, pelican tertentu, air) 2) Jika rasa gatal berlanjut, mungkin terjadi infeksi atau alergi terhadap bahan latex 4. Mengurangi Kenikmatan Senggama a. Konseling: Jelaskan sebab terjadinya b. Pengobatan: ganti kondom yang lebih tipis atau mengganti metode kotrasepsi									
III	SIKAP 1. Menjelaskan secara sistematis 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 3. Mendokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan									
IV	PENYELESAIAN Melakukan dokumentasi hasil konseling dalam kartu KB dan buku register									