SOP PEMBERIAN VAKSIN TT

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab Tgl.			Ujian Tgl.			Klinik Tgl.		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
I	PERSIAPAN ALAT 1. Bak injeksi steril 2. Kapas suntim dalam tempatnya 3. spuit injeksi 3 cc 4. Vaksin Tetanus Toksoid dalam thermos es 5. Tempat sampah kering 6. Larutan klorin 0,5 % 7. Bengkok.									
II	PERSIAPAN PASIEN 1. Jelaskan kepada pasien tujuan dan tindakan yang akan diberikan. 2. Pasien duduk dengan rileks.									
III	PERSIAPAN TINDAKAN PEMBERIAN VAKSIN TT 1. Buka box vaksin dan siapkan vaksin yang dibutuhkan 2. Lihat botol vaksin apakah ada yang rusak atau terdapat perubahan warna pada vaksin (jika ada, jangan gunakan vaksin tersebut) 3. Cuci botol vaksin dengan air sabun jika kotor 4. Keringkan dengan handuk bersih atau pengering lainnya									
IV	PROSEDUR SEBELUM PEMBERIAN 1. Bawa box vaksin dan tempatkan di udara yang sejuk 2. Jalin hubungan dengan klien : beri salam, anjurkan untuk duduk dengan nyaman, dan perkenalkan diri anda 3. Kaji ibu apakah sudah mendapatkan imunisasai TT atau belum, kalau sudah berapa kali mendaptkan imunisasi TT 4. Jelaskan prosedur dan pentingnya imuninsasi TT 5. Periksa kartu Antenatal untuk mengetahui usia kehamilan ibu 6. Jelaskan kepada ibu jenis imunisasi yang akan dia terima 7. Jelaskan reaksi dari pemberian vaksin tersebut dan apa yang harus ibu lakukan 8. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih dan keringkan 9. Gunakan alas yang bersih pasa permukaan yang akan digunakan untuk menyimpan vaksin 10. Susun alat atau perlengkapan untuk imunisasi di atas permukaan yang bersih agar mudah digunakan 11. Memeriksa peralatan imunisasi yang akan									

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab Tgl.			Ujian Tgl.			Klinik Tgl.		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
	digunakan									
V	PEMBERIAN IMUNISASI TT 1. Tenangkan klien 2. Jelaskan pasa klien tentang reaksi dari vaksinasi dan apa yang harus dilakukan 3. Ambil vaksin dari box vaksin dan cek tanggal kadaluarsa, warna dan cara pemberian 4. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih serta keringkan 5. Bersihkan tutup karet vial 6. Isi spuit sesuai dengan dosis yang dibutuhkan (0,5 cc) 7. Keluarkan udara yang terdapat di dalam spuit 8. Anjurkan ibu untuk membebaskan daerah yang akan disuntik 9. Pilih daerah yang tepat (musculus deltoideus) 10. Bersihkan daerah yang akan disuntik dengan kapas DTT (jangan menggunakan antiseptic) 11. Suntikkan dengan cara IM atau subcutan dengan jarum yang sesuai 12. Tarik jarum setelah semua vaksin masuk 13. Tekan daerah bekas suntikan dengan kapas atau kasa untuk menghentikan perdarahan jika diperlukan 14. Buang kapas atau kassa yang sudah dipakai sesuai dengan prosedur PI 15. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih serta keringkan									
VI	SETELAH PELAKSANAAN 1. Catat pemberian imunisasi pada kartu ANC 2. Beritahu ibu untuk tidak mengoleskan salep atau memijat daerah bekas suntikan 3. Anjurkan ibu untuki membertahu reaksi yang dirasakan 4. Minta ibu untuk menyebutkan kembali imunisasi yang telah diberikan 5. Beritahu ibu jadwal suntikan berikutnya 6. Ucapkan terima kasih pada ibu 7. Bereskan peralatan yang telah digunakan sesuai dengan langkah-langkah PI 8. Bersihkan daerah yang terkontaminasi dengan larutan klorin 0,5 % 9. Cuci tangan dan keringkan 10. Tutup lagi vaksin yang telah digunakan jika akan digunakan dalam 24 jam dan simpan dalam tempatnya (box vaksin) 11. Keluarkan dari box vaksin 12. Masukkan dalam refrigrator dan tutup dengan									

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab Tgl.			Ujian Tgl.			Klinik Tgl.		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
	benar 13. Bersihkan box vaksin 14. Simpan box vaksin pada tempat yang bersih dan kering									