## SOP PEMERIKSAAN KADAR GLUKOSA IBU HAMIL

| No | KOMPONEN KERJA | PENCAPAIAN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lab Tgl. ..... | | | Ujian Tgl. ..... | | | Klinik Tgl. ..... | | |
| | NILAI | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| I | PERSIAPAN ALAT<br>1. Tabung reaksi (2)<br>2. Penjepit tabung reaksi<br>3. Rak tabung reaksi<br>4. Pipet tetes<br>5. Corong<br>6. Pipet volume<br>7. Lampu spiritus/Bunsen<br>8. 5 cc larutan benedict<br>9. Botol urine<br>10. Handscoen<br>11. Celemek<br>12. Bengkok<br>13. Kertas saring<br>14. Korek api<br>15. Tissue | | | | | | | | | |
| II | PENATALAKSANAAN<br>1. Sediakan 2 tabung reaksi bersih dan kering dalam rak tabung<br>2. Isi kedua tabung tersebut masing-masing dengan reagen benedict sebanyak 5 ml<br>3. Isi tabung kedua dengan sampel urine patologis sebanyak 0,5 ml (5 – 8 tetes), kocok secara homogen<br>4. Nyalakan lampu spirtus, kemudian bakar tabung kedua di atas nyala api dengan menggunakan penjepit tabung sambil dikocok perlahan sampai akan mendidih antara 1-2 menit<br>5. Begitu larutan mendidih segera angkat, dan simpan dalam rak tabung reaksi biarkan selama 5 menit<br>6. Amati hasilnya dan bandingkan dengan tabung kesatu. Hasil Pembacaan :<br>a. (-) : Bila larutan dalam tabung tetap biru<br>b. (+ / -) : Bila larutan berwarna biru kehijauan<br>c. (+) : Bila larutan berwarna hijau disertai dengan endapan berwarna kuning<br>d. (++) : Bila larutan berwarna kuning<br>e. (+++) : Bila larutan berwarna oranye endapan kuning<br>f. (++++) : Bila larutan berwarna merah bata<br>7. Catat dan sampaikan hasilnya ke pasien | | | | | | | | | |